



## SIRINGA PER SCARAFAGGI DOBOL GEL

Categoria: PMC

Esca insetticida per il controllo degli scarafaggi - uso domestico e civile

**Registrazione Ministeriale:**

n. 19429

**Formulazione:**

Gel

**Composizione:**

**100 grammi di prodotto contengono:**

Acetamiprid: 2.00g

**Caratteristiche:**

Esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, *Suppella longipalpa*, *Polyphaga aegyptiaca*). Il gel è efficace su blatte di tutte le età, sui maschi e sulle femmine. DOBOL® GEI PRO contiene Acetamiprid, sostanza attiva di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, il prodotto agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico. DOBOL® GEI PRO combina attrattività, palatabilità ed efficacia insetticida. **Attrattività:** il prodotto contiene sostanze alimentari e additivi che attraggono gli insetti fino a un metro di distanza. **Palatabilità:** le sostanze alimentari contenute stimolano il processo di alimentazione delle blatte. Ciò garantisce l'assunzione di dosi letali di sostanza attiva. **Efficacia:** prove pratiche d'uso hanno dimostrato che si ottiene l'eliminazione dell'intera popolazione di blatte dopo circa 5 o 6 giorni di applicazione. DOBO® GEI PRO è stabile ed attivo per molte settimane dopo l'applicazione. Il prodotto non trasuda, non cola, non macchia e non si secca.

**Modalità d'impiego:**

Applicare gocce di prodotto della grandezza di una lenticchia in fessure, crepe murali, sui battiscopa, sulle scatole elettriche,

sulle condutture dell'acqua e in tutti gli anfratti bui, umidi e caldi dove le condizioni ambientali favoriscono il proliferare delle blatte.

Come trattamento preventivo o in presenza solo di **Blattella germanica** utilizzare le dosi di seguito riportate:

- cucina o altri luoghi preposti alla preparazione dei cibi: 2/3 gocce m<sup>2</sup>
- bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/3 gocce m<sup>2</sup>
- altri ambienti: 1/2 gocce ogni 10-15 m<sup>2</sup>

Come trattamento curativo o in caso di presenza anche di **Blatta orientalis**:

- cucina o altri luoghi preposti alla preparazione dei cibi: 4/6 gocce m<sup>2</sup>
- bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/4 gocce m<sup>2</sup>
- altri ambienti: 2/4 gocce ogni 10-15 m<sup>2</sup>

### Tipologia di utilizzo:

Domestico

### Avvertenze:

Conservare nel contenitore originale – Non impiegare in agricoltura – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

### Confezioni di vendita:

Siringa da 10 g

### Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.